

Alumna: Laura García Ramos

Rodríguez-Martín, Boris C., Gallego-Arjiz, Belén., López-Ewert, Patricia., Reguera-Errasti, Jacobo., Quevedo, María y Broche-Pérez, Yunier

2019

Los primeros 90 días de tratamiento de adicciones: el rol de los grupos de apoyo para familiares

Revista Internacional de Investigación en Adicciones

Fundación Recal

ISSN: 2448-573X (versión impresa) / 2448-6396 (versión en línea)

España

Pp. 6-14

<http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2019.1.02/254>

Listado, el número de recursos consultados

<https://scholar.google.es/schhp?hl=es>

<http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2019.1.02>

<http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2019.1.02/254>

Reseña

El presente estudio se realizó con el objetivo de explorar la interacción de los factores referidos al paciente y la incorporación de sus familiares en el plan terapéutico, con la finalización de los primeros 90 días de tratamiento. Es un estudio ex post facto retrospectivo con 234 pacientes entre 18 y 75 años, atendidos en la Fundación Recal en el período desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2018. Se registró un grupo de variables sociodemográficas y clínicas, de las que se analizó su interacción con la finalización o abandono del tratamiento, mediante la utilización de un algoritmo CHAID.

Resulta importante señalar que algunos datos, como el diagnóstico específico de la patología dual, así como el tipo de sustancia que consume el paciente, fueron excluidos debido a que el número de observaciones registradas era inferior al de los criterios establecidos por el algoritmo CHAID para su correcta clasificación.

De los resultados del CHAID se muestran que una proporción importante de pacientes ingresados en la Fundación Recal suele finalizar su tratamiento (68.8%). La asistencia de los familiares a los Grupos de Apoyo puede considerarse la principal variable de interacción con la Finalización del Tratamiento en los pacientes de la Fundación Recal. Se observó un predominio de finalizaciones en aquellos pacientes cuyos familiares asistieron a los Grupos de Apoyo.

Por último, se detecta que el modelo es adecuado para predecir la finalización del tratamiento, pero no el abandono. Lo que parece sugerir que la asistencia de la familia a los Grupos de Apoyo resulta un factor que contribuye a la alta terapéutica, pero que su ausencia no implica lo mismo para predecir el abandono.

Los autores resaltan que los resultados de este estudio deben ser analizados tomando en cuenta las limitaciones del mismo, ya que hay varias consideraciones que son específicas del estudio y puede diferir de otras investigaciones que contemplen otras variables y otros lugares.